



## مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه غیرپزشک)

صفحه	نمودارهای رشد	صفحه	پیگیری	صفحه	مشاوره با مادر	صفحه	ارزیابی و طبقه بندی
۲۲	وزن به سن کمتر از ۳ سال - پسر	۲۰	مشکلات تغذیه ای	۱۵	مشکلات تغذیه ای	۲	ارزیابی کودک کمتر از ۲ ماه از نظر نشانه های خطر
۲۳	وزن به سن کمتر از ۳ سال - دختر	۲۰	اختلال رشد یارشدن اعلام	۱۵	طرز صحیح شیردهی و بغل کردن	۲	ارزیابی کودک ۲ ماهه تا ۸ سال از نظر وضعیت عمومی
۲۴	وزن به سن بالای ۳ سال - پسر	۲۰	رشقدی نامطلوب یا نامعلوم	۱۵	توصیه درمانی برای برفک	۳	ارزیابی کودک کمتر از ۲ ماه از نظر زردی
۲۵	وزن به سن بالای ۳ سال - دختر	۲۰	دورسرو نامطلوب یا نامعلوم	۱۶	پیشگیری از حوادث و سوانح در زیر یک سال	۴	ارزیابی کودک از نظر وضعیت وزن
۲۶	قد به سن کمتر از ۲ سال - پسر	۲۱	مشکل تکاملی	۱۷	پیشگیری از حوادث از یک سالگی تا ۶ سالگی	۵	ارزیابی کودک از نظر وضعیت قد
۲۷	قد به سن کمتر از ۲ سال - دختر	۲۱	زردی	۱۸	رابطه مقابل کودک و والدین کمتر از ۲ سال	۶	ارزیابی کودک از نظر وضعیت دورسر
۲۸	قد به سن بالای ۲ سال - پسر	۲۱	برفک	۱۹	بهداشت دهان و دندان	۷	ارزیابی کودک از نظر وضعیت تغذیه
۲۹	قد به سن بالای ۲ سال - دختر	۲۱	مشکلات دهان و دندان			۸	جدول توصیه های تغذیه ای برای گروه های سنی
۳۰	دورسر به سن کمتر از ۱۸ ماه - پسر					۹	ارزیابی کودک از نظر وضعیت دهان و دندان: (بالای ۲ سالگی)
۳۱	دورسر به سن کمتر از ۱۸ ماه - دختر					۱۰	ارزیابی کودک از نظر وضعیت بینایی
						۱۱	ارزیابی کودک از نظر وضعیت تکامل
						۱۲	جدول تکامل کودکان برای گروه های سنی کمتر از ۲ سال
						۱۳	جدول تکامل برای گروه های سنی ۳ سال تا ۸ سال
						۱۳	ارزیابی کودک از نظر واکسیناسیون
						۱۴	ارزیابی کودک از نظر وضعیت مکمل های دارویی
						۱۴	ارزیابی کودک از نظر وضعیت آزمایش

## ارزیابی، طبقه بندی و توصیه های کودک سالم کمتر از ۸ سال

- مشخص کنید برای مراقبت های دوره ای آمده است یا برای مراقبت ویژه مراجعه کرده است؟

- اگر برای مراقبت ویژه آمده به قسمت پیگیری مراجعه نمایید.

- اگر برای مراقبت های دوره ای مراجعه کرده کودک را به ترتیب زیر ارزیابی کنید:

### ارزیابی شیرخوارکمتر از ۲ ماه از نظر نشانه های خطر :

سوال کنید :	مشاهده کنید: تنفس	حال عمومی	نشانه ها	طبقه بندی	توصیه ها
• آیا توانائی شیرخواردن را دارد؟	<ul style="list-style-type: none"> <li>شیرخوار باید آرام باشد</li> <li>تنفس تند ( ۶۰ بار در دقیقه یا بیشتر)</li> <li>باز و بسته شدن سریع پره های (پرش) بینی</li> <li>توکشیده شدن قفسه سینه</li> <li>ناله کردن</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>کاهش سطح هوشیاری</li> <li>بی قراری و تحریک پذیری</li> <li>تحرک کمتر از معمول و بی حالی</li> <li>برآمدگی ملاج</li> <li>درجه حرارت بالا ( بیشتر از ۳۷</li> <li>درجه حرارت پایین (کمتر از ۳۶</li> <li>رنگ پریدگی شدید</li> <li>سیا نوز</li> <li>زردی ۲۴ ساعت اول</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>در صورت مشاهده هریک از نشانه های خطر شیرخوار نیاز به توجه فوری داشته، ارزیابی و درمان قبل از ارجاع رامطابق چارت مانا انجام داده و سریعاً ارجاع نمایید</li> </ul>	باکتریال شدید (۱)	احتمال عفونت باکتریال شدید
			<ul style="list-style-type: none"> <li>هیچکدام از نشانه های فوق را نداشته باشد</li> </ul>	باکتریال شدید ندارد (۲)	عفونت

### ارزیابی کودک ۲ ماهه تا ۸ سال از نظر وضعیت عمومی:

سؤال کنید:	نگاه کنید:	توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها	طبقه بندی	توصیه ها
حال کودک شما چطور است؟	<ul style="list-style-type: none"> <li>رنگ پریدگی</li> <li>سیانوز لب ها</li> <li>ادم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بی حالی یا رنگ پریدگی یا سیانوز لب ها یا ادم</li> </ul>	مشکل جدی احتمالی (۱)	<ul style="list-style-type: none"> <li>بی حالی یا رنگ پریدگی یا سیانوز لب ها یا ادم</li> </ul>	مشکل جدی احتمالی (۱)	<ul style="list-style-type: none"> <li>اگر مادر احساس می کند حال کودکش خوب نیست یا کودک بی حال است برای ارزیابی و درمان به چارت مانا مراجعه کنید در غیر اینصورت :</li> <li>کودک را برای ارزیابی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهد</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>هیچکدام از نشانه های فوق را نداشته باشد</li> </ul>	مشکل جدی ندارد (۲)			<ul style="list-style-type: none"> <li>مادر را برای ارزیابی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهد</li> <li>مادر را در مورد پیشگیری از حوادث و سوانح آموزش بدهید</li> </ul>

## ارزیابی کودک از نظر زردی (شیرخوار زیر ۲ماه)

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها
شیرخوار را فورا به نزدیکترین مرکز درمانی ارجاع دهید	زردی شدید (۱)	<ul style="list-style-type: none"> <li>سابقه زردی خطرناک در فرزندان قبلی یا گسترش زردی پائین ترازشکم یا وزن زمان تولد او کمتر از ۲۵۰۰ گرم یا سن حاملگی کمتر از ۳۷ هفته یا مادر <b>Rh</b> منفی</li> </ul>
↗ به مادر توصیه کنید به دفعات بیشتر و مدت طولانی تر کودک را شیر بدهد ↗ بعدازیک روز پیگیری کنید ↗ در اولین فرصت به وسیله پزشک معاینه شود	زردی خفیف (۲)	<ul style="list-style-type: none"> <li>هیچکدام از نشانه های زردی شدید را نداشته باشد</li> </ul>
↗ مادر را به شیردادن مکرر تشویق نمایید	زردی ندارد (۳)	<ul style="list-style-type: none"> <li>سفیدی چشم و نوک بینی زرد نباشد</li> </ul>

زردی قبل از ۱۴ روزگی

طبقه بندی کنید

ادامه زردی بعد از ۱۴ روزگی

به سفیدی چشم و نوک بینی شیرخوار نگاه کنید

اگر شیرخوار زردی دارد:

سوال کنید	مشاهده کنید
<ul style="list-style-type: none"> <li>برای چه مدتی؟</li> <li>آیا مادر <b>Rh</b> منفی است؟</li> <li>آیا سابقه زردی خطرناک* در فرزندان قبلی وجود داشته است؟</li> <li>آیا سن حاملگی کمتر از ۳۷ هفته می باشد؟</li> <li>آیا وزن زمان تولد او کمتر از ۲۵۰۰ گرم می باشد؟</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>به گسترش زردی در سطح بدن توجه کنید</li> </ul>

↗ برای ارزیابی بیشتر به مرکز درمانی ارجاع دهید	زردی طولانی مدت (۴)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ادامه زردی بعد از ۱۴ روزگی</li> </ul>
--	------------------------	--

\* زردی خطرناک: زردی منجر به فوت یا عقب ماندگی ذهنی و یا نیاز به تعویض خون

## ارزیابی کودک از نظر وضعیت وزن

آیا منحنی رشد کودک قبل از سم شده است؟

اگر بله :

پس از رسم منحنی وزن کودک در کارت رشد با وزن  
قبلی او مقایسه کنید.

طبقه بندی  
کنید

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها
» برای ارزیابی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید	سوء تغذیه شدید یا کم وزنی شدید (۱)	• زیر منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار
» برای اختلال رشد کودک زیر ۲ماه ۱۰ روز، ۲ ماهه تا یکسال ۲ هفته و بالای یکسال یکماه بعد پیگیری کنید.	اختلال رشد دارد (۲)	• بالای منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار) ولی موازی و صعودی نبوjen یامنحنی رشد
» مادر را تشویق کنید که تغذیه کودکش را همچنان ادامه بدهد	اختلال رشد ندارد (۳)	• بالای منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار) موازی و صعودی بامنحنی رشد

» برای ارزیابی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید	سوء تغذیه شدید یا کم وزنی شدید (۱)	• زیر منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار)
» برای بررسی رشد کودک زیر ۲ماه ۱۰ روز، ۲ ماهه تا یکسال ۲ هفته و بالای یکسال یکماه بعد پیگیری کنید.	رشد نامعلوم (۴)	• بالای منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار)

اگر خیر :  
وزن کودک برای سن را در کارت پایش رشد رسم کنید.


طبقه بندی  
کنید

## ارزیابی کودک از نظر وضعیت قد:

آیا منحنی رشدقدی کودک قبل از مقدمه شده است؟

اگربلی :

پس از مقدمه قدکودک با قد قبلی او مقایسه کنید



توصیه ها	طبقه بندی	نشانه
» برای ارزیابی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید	کوتاه قدی شدید (۱)	• زیر منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار)
» برای اختلال رشد کودک زیردو سال ۳ ماه و بالای دو سال ۶ ماه بعد پیگیری کنید.	رشد قدی نامطلوب (۲)	• بالای منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار) ولی موازی و صعودی نبودن با منحنی قد
» مادر را تشویق کنید که تغذیه کودکش را همچنان ادامه بدهد.	رشد قدی مطلوب (۳)	• بالای منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار) و موازی و صعودی با منحنی قد

» برای ارزیابی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید	کوتاه قدی شدید (۱)	• زیر منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار)
» برای بررسی رشد کودک زیردو سال ۳ ماه و بالای دو سال ۶ ماه بعد پیگیری کنید	رشد قدی نامعلوم (۴)	• بالای منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار)

## ارزیابی کودک از نظر وضعیت دورسر(شیرخوار زیر ۱۸ ماه)

آیا منحنی دورسر کودک قبل رسم شده است؟

اگربلی :

پس از رسم دورسر کودک با دورسر قبلی مقایسه کنید

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه
کودک را برای بررسی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید	دورسر غیر طبیعی (۱)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• زیر منحنی قرمز (۳- انحراف معیار) یا بالای صدک ۹۷</li> </ul>
کودک زیر ۶ ماه را، دوهفته و بالای ۶ ماه را یک ماه بعد پیگیری کنید	دورسر نامطلوب (۲)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بالای منحنی قرمز و زیر صدک ۹۷ و موازی نبودن با منحنی دور سر</li> </ul>
مادر را تشویق کنید که مراقبتهای بعدی را نجام دهد	دورسر طبیعی (۳)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بالای منحنی قرمز و زیر صدک ۹۷ و موازی بودن با منحنی دور سر</li> </ul>

کودک را برای بررسی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید	دورسر غیر طبیعی (۱)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• زیر منحنی قرمز (۳- انحراف معیار) یا بالای صدک ۹۷</li> <li>• بالای منحنی قرمز و زیر صدک ۹۷</li> </ul>
کودک زیر ۶ ماه را دوهفته و بالای ۶ ماه را یکماه بعد پیگیری کنید	دورسر نامعلوم (۲)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بالای منحنی قرمز و زیر صدک ۹۷</li> </ul>

طبقه بندی کنید

اگر خیر :  
دورسر کودک را روی منحنی دورسر رسم کنید

طبقه بندی کنید

پس از رسم دورسر کودک با دورسر قبلی مقایسه کنید

## ارزیابی کودک ازنظر وضعیت تغذیه:

چوابهای مادر را با توصیه های تغذیه ای برای گروههای سنی طبق جدول زیر مقایسه کنید.

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها
» براساس چارت مانا ارزیابی و درمان کنید	احتمال عفونت باکتریال (۱)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قادر به شیرخوردن یا غذا خوردن نیست یا</li> <li>• به هیچ وجه پستان را نمی گیرد یا</li> <li>• نمی تواند بمک</li> </ul>
» توصیه های مشاوره با مادر در مورد مشکلات تغذیه ای (صفحه ۱۴) را انجام دهید » اگر خوب پستان نمی گیرد یا خوب نمی مکد طرز صحیح آغوش گرفتن و روی پستان قرار دادن (صفحه ۴) را به مادر آموخته دهید. » اگر برفک دارد و بالای ۲ ماه است به مرکز بهداشتی ارجاع دهید در غیراینصورت درمان در منزل را به مادر آموخته دهید » بعد از هر روز (کودک بالای ۲ ماه) و ۱ روز (کودک کمتر از ۲ ماه) را پیگیری کنید	مشکلات تغذیه ای دارد (۲)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مطابقت با توصیه های تغذیه ای ندارد یا</li> <li>• خوب پستان نمی گیرد یا</li> <li>• خوب نمی مکد یا</li> <li>• وجود برفک یا</li> <li>• اختلال رشد دارد</li> </ul>
» توصیه های پیشگیری از حوادث وسوانح در منزل را به مادر بگویید. » مادر را در مورد تغذیه خوب کودک تشویق کنید.	مشکلات تغذیه ای ندارد (۳)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مطابقت با توصیه های تغذیه ای دارد</li> </ul>

**سؤال کنید:**

- (در کودکان زیردو سال) آیا کودک شیر خودتان را می خورد؟  
اگر بلی: چند بار در روز؟ آیا در طول شب هم شیر می دهد؟  
آیا کودک غذا یا مایعات دیگر می خورد؟  
اگر بلی: چه نوع غذا یا مایعات؟ چند بار در روز؟  
**کودک بالای ۴ ماه :**  
اگر اختلال رشد دارد: چه مقدار غذا برای هر وعده به او می دهد؟ چه کسی و چگونه او را تغذیه می کنید؟

**کودک زیر ۴ ماه اگر:**

مشکل شیرخوردن دارد،  
کمتر از ۸ بار در ۲۴ ساعت شیرمی خورد  
چیزی دیگری می خورد یا آشامد  
اختلال رشد دارد

**ارزیابی تغذیه با شیر مادر:**

اگر کودک در ساعت گذشته شیر نخورده است از مادر بخواهد اور اشیر بدهد و برای ۴ دقیقه اور امشاهده کنید (غیراینصورت از مادر بخواهد اگر امکان دارد صبر کنید) مفع شیرخوردن بعدی به شما اطلاع دهد.)

**آیا شیرخوار قادر به گرفتن پستان می باشد؟**

**نحوه گرفتن پستان:**

- چانه به پستان چسبیده
- دهان باز است
- لب پایین به بیرون برگشته است
- نوک و قسمت بیشتری از هاله پستان در دهان شیرخوار است

در صورت مشاهده تمامی نشانه های فوق در قسمت خوب پستان می گیرد علامت بزنید

**آیا شیرخوار می تواند خوب بمکد؟**

خوب می مکد / خوب نمی مکد / نمی تواند بمکد  
بینی شیرخوار الگرمانع تغذیه اوست تمیز کنید.  
از نظر برفک، دهان را مشاهده کنید.

## توصیه های تغذیه ای

۲ سال و بیشتر	۱۲ ماه تا ۲ سال	۶ ماه تا ۱۲ ماهگی	۴ تا ۶ ماهگی	تا ۴ ماهگی
<ul style="list-style-type: none"> <li>دادن غذاهای خانواده حداقل ۳ وعده در روز.</li> <li>همچنین، دوبار روزانه میان وعده های غذائی داده شود:</li> </ul> <p>..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>هر چقدر کودک میل دارد او را با شیرمادر تغذیه کنید.</li> <li>دادن غذاهای کافی:</li> </ul> <p>..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... .</p> <p>یا غذاهای خانواده ۵ بار در روز</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>هر چقدر کودک میل دارد او را با شیرمادر تغذیه کنید.</li> <li>دادن غذاهای کافی:</li> </ul> <p>..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... .</p> <p>- ۳ بار در روز اگر شیرمادر خوار است - ۵ بار در روز اگر شیر مادر خوار نیست</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>هر چقدر کودک میل دارد شیرمادر بخورد، روز و شب، حداقل ۸ بار در ۲۴ ساعت اگر کودک اضافه وزن مناسب نداشته باشد</li> <li>تعداد دفعات شیردهی را فزایش دهید.</li> <li>یک تا دو بار در روز بعد از تغذیه با شیرمادر غذاهای کمکی به او بدهید.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>هر چقدر کودک میل دارد شیرمادر بخورد، روز و شب، حداقل ۸ بار در ۲۴ ساعت</li> <li>هیچ غذا یا مایعات دیگری به او ندهید.</li> </ul>

## ارزیابی کودک از نظر وضعیت دهان و دندان:(بالای ۲ سالگی)

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها
<ul style="list-style-type: none"> <li>﴿ اقدامات مربوط به بیرون افتادن کامل دندان را انجام دهید</li> <li>﴿ اگر درد دارد استامینوفون بدھید</li> <li>﴿ در اسرع وقت کودک را برای ارزیابی بیشتر به دندانپیشک ارجاع دهید</li> </ul>	مشکل دندانی شدید (۱)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• درد یا بیرون افتادن کامل دندان از دهان یا</li> <li>• تورم و قرمزی لثه ها یا تورم صورت یا</li> <li>• پوسیدگی دندانها(بیش از ۱۰ دندان یا سندرم شیشه شیر)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>﴿ روشاهای صحیح مسوак زدن را به مادر آموزش دهید</li> <li>﴿ توصیه های بهداشت دهان و دندان را به والدین آموزش دهید</li> <li>﴿ در اولين فرصت برای ارزیابی بیشتر به دندانپیشک مراجعه کند</li> </ul>	مشکل دندانی دارد (۲)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• پوسیدگی دندان ها(کمتر از ۱۰ دندان) تاخیر در رویش مکیدنهای غیر تعذیه ای (بعد از ۴ سالگی)</li> <li>• سابقه ضربه به دندان</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>﴿ اگر کمتر از ۲ بار مسوак می زند یا والدین در مسواك زدن برای کودک همکاری نمی کند روشاهای صحیح مسواك زدن را به مادر آموزش دهید و روز بعد مراجعاً کند</li> <li>﴿ توصیه های بهداشت دهان و دندان را به والدین آموزش دهید و آنها را برای انجام معاینات دوره ای * توسط دندانپیشک / بهداشت کاردهان و دندان الزام نمایید.</li> <li>﴿ والدین را تشویق کنید که در مراقبتهای بعدی مراجعه کند</li> </ul>	مشکل دندانی ندارد (۳)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اگر والدین در مسواك زدن برای کودک همکاری نمی کنند یا کودک کمتر از دو بار مسواك می زند یا هیچکی از نشانه های فوق را ندارد</li> </ul>

طبقه بندی  
کنید

نگاه کنید:	سؤال کنید:
• پوسیدگی دندان ها یا سندرم شیشه شیر	• آیا والدین در مسواك زدن به کودک کمک می نمایند؟
• تاخیر رویش *	• آیا کودک به تنها یا با همکاری والدین ۲ بار در روز مسواك می کند؟
• تورم و قرمزی لثه ها	• آیا کودک شما سابقه ضربه به دندانها دارد؟
• تورم صورت	• آیا کودک دندان درد دارد؟

**\* بعداز ۵ سالگی: آیا کودک شما عادات غلط دهانی(مثل مکیدن انگشت شست: پستانک، ۰۰۰ دارد؟**

### \* جدول تاخیر رویش دندان

دندان شیری	فک بالا	دندان دایمی	فک پایین	فک بالا	دندان شیری
پیش میانی ۱۹ ماهگی	۱۷ ماهگی	پیش میانی ۱۰ سالگی	۹ سالگی	پیش طرفی ۲۰ ماهگی	پیش طرفی ۱۱ سالگی
پیش طرفی ۲۰ ماهگی	۲۲ ماهگی	نیش ۲۸ ماهگی	۱۲ سالگی	نیش ۲۹ ماهگی	نیش ۱۲ سالگی
آسیای اول ۲۴ ماهگی	۲۵ ماهگی	اولين آسيای كوچك ۱۳ سالگی	۱۳ سالگی	اولين آسيای كوچك ۱۴ سالگی	دومن آسيای كوچك ۱۵ سالگی
آسیای دوم ۲۵ ماهگی	۳۷ ماهگی	اولين آسيای بزرگ ۹ سالگی	۹ سالگی	اولين آسيای بزرگ ۱۵ سالگی	دومن آسيای بزرگ ۱۵ سالگی

## ارزیابی کودک از نظر وضعیت بینایی:

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها
﴿ هر چه سریعتر کودک را برای ارزیابی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید. ﴾	مشکل بینایی دارد (۱)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• در صورت پاسخ منفی در هرگروه سنی یا ظاهیری احرکات غیر طبیعی چشم یا</li> <li>• قدرت بینایی کمتر از <math>\frac{7}{10}</math> یا دو خط یا بیشتر اختلاف بین چشم ها</li> </ul>
﴿ به مادر زمان مراقبت بعدی را تلاع دهید. ﴾	مشکل بینایی ندارد (۲)	<p>هیچیک از نشانه های فوق را ندارد</p>

**طبقه بندی  
کنید**

جوابهای مادر را با جدول بینایی برای گروههای سنی مقایسه کنید		
سن	سؤال کنید:	نگاه کنید:
تا ۲ ماهگی	• آیا به صورت شما نگاه می کند؟ • آیا چشم هایش را در مقابل نور می بندد؟	• ظاهر چشم* • حرکات چشم
تا ۶ ماهگی	• آیا با توجه به اطراف نگاه می کند؟ • آیا برای گرفتن اشیاء واکنش نشان می دهد؟	
تا ۹ ماهگی	• آیا چشم ها با هم دیگر هماهنگ حرکت می کند؟ • آیا سباب بازی خیلی کوچک را می تواند حرکت دهد؟	
تا ۱۲ ماهگی	• آیا به اشیاء مورد دلخواه اشاره می کند؟ • آیا فردرا قبل از صحبت کردن در موقع داخل شدن به اتاق می شناسد؟	
تا ۸ سالگی	• آیا هیچ نگرانی درباره نحوه دیدن کودک خود دارد؟	• ظاهر و حرکات چشم • تست قدرت بینایی بعداز عسالگی

\* ظاهر و حرکات چشم را از نظر بازو بسته شدن پلک ها، پرخونی عروق ملتحمه، کدورت و اندازه قرنیه، تنبلی چشم، اندازه ورنگ مردمک و اخراج چشم نگاه کنید.

## ارزیابی کودک از نظر وضعیت تکامل

جوایهای مادر را با جدول تکامل برای گروههای سنی مقایسه کنید.

سوال کنید:

۱. آیا رفتار کودک شمامتل سایر کودکان هم سن خود می باشد؟

۲. آیا هیچ نگرانی درباره نحوه حرف زدن کودک خود دارد؟

۳. آیا هیچ نگرانی درباره نحوه فهمیدن چیزهای که به او می گوید دارد؟

۴. آیا هیچ نگرانی درباره نحوه استفاده از دست ها و انکشاف آنها دارد؟

۵. آیا هیچ نگرانی درباره نحوه استفاده از پاها و بازو هایش دارد؟

برای کودکان ۵ ساله و بالاتر سوال کنید:

۶. آیا هیچ نگرانی درباره یادگیری انجام دادن کارها مانند سایر کودکان هم سن خود دارد؟

۷. آیا هیچ نگرانی درباره یادگیری مهارت های پیش از دبستانی و دبستانی کودک خود دارد؟

تصویه ها	طبقه بندی	نشانه ها
﴿ هر چه سریعتر کودک را برای ارزیابی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهد. ﴾	مشکل تکاملی شدید (۱)	۰ یا بیشتر از نگرانی های کلیدی * را دارد
﴿ کودک را برای ارزیابی بیشتر به پزشک مرکز بهداشتی درمانی ارجاع غیر فوری دهد. ﴾	مشکل تکاملی نامعلوم (۲)	<ul style="list-style-type: none"> <li>۰ یکی از نگرانی های کلیدی را دارد یا</li> <li>۰ دو یا بیشتر از نگرانی های غیر کلیدی را دارد یا</li> <li>۰ مشکل در برق راری ارتباط باوالدین</li> </ul>
﴿ اگریکی از نگرانی های غیر کلیدی را دارد به مادر تصویه کنید که توجه کامل به این نگرانی داشته باشد و ۲ هفته دیگر مراجعت کند. در غیر این صورت:	مشکل تکاملی ندارد (۳)	<ul style="list-style-type: none"> <li>۰ هیچیکی از نگرانی های کلیدی را دارد یا</li> <li>۰ یکی از نگرانی های غیر کلیدی را دارد</li> </ul>

طبقه بندی  
کنید

\* نگرانی های کلیدی با رنگ قرمز در جدول تکامل مشخص شده است

## جدول تکامل کودکان ۱/۵ ماهگی تا ۲۴ ماهگی

۲۴ ماهگی	۱۸ ماهگی	۱۵ ماهگی	۱۲ ماهگی	۹ ماهگی	۶ ماهگی	۴ ماهگی	۲ ماهگی	تا ۳۰ روزگی	
۰ درآوردن جلیقه لباس	۰ استفاده از قاشق و چنگال	۰ توپ بازی	۰ دست دستی کردن	۰ خودش غذا می خورد	۰ تلاش برای گرفتن اسباب بازی	۰ شناخت دستهایش	۰ لبخند زدن	۰ توجه به صورت	۱
۰ ترکیب کلمات	۰ حداقل ۳ کلمه	۰ حداقل یک یادوکلمه	۰ بابا و ماما مفهوم	۰ بابا و ماما نامفهوم	۰ تقلید صدای "او"	۰ جیغ کشیدن	۰ درآوردن صدای ا - او	۰ درآوردن صدای آرام	۲
۰ نشان دادن ۶ قسمت بدن	۰ فهمیدن صحبت با او		۰ پاسخ به اسمش یا کلمات آشنا	۰ گوش کردن با دقت به صدای آشنا	۰ برگشتن به طرف صداها	۰ توجه به صدای جفجه	۰ آرام شدن با صدای مادر	۰ پاسخ به صدای زنگ	۳
۰ بازکردن دکمه لباس	۰ برگرداندن شیشه	۰ خط خطی کردن	۰ انداختن اشیاء در استکان	۰ برداشتن اشیای کوچک	۰ چنگ زدن یا گرفتن اشیاء بزرگ(جفجه)	۰ رساندن دست ها به همیگر		۰ حرکات انگشتان	۴
۰ از پله بالارفتن	۰ دویدن	۰ خوب راه رفتن	۰ ایستادن بمدت چند ثانیه	۰ نشستن بدون کمک	۰ غلت زدن	۰ ثابت نگه داشتن سر در حالت نشسته	۰ بلند کردن سر تا ۴۵ درجه	۰ بالا آوردن لحظه ای سر در حالتی که شیر خوارروی شکم خوابیده	۵

## جدول تکامل کودکان ۳ تا ۸ ساله

۸ سالگی	۷ سالگی	۶ سالگی	۵ سالگی	۴ سالگی	۳ سالگی	
		• شیرین کردن چای	• مسوак زدن بدون کمک	• پوشیدن لباس بدون کمک	• شستن و خشک کردن دست ها	۱
		• شمارش ۵ شیء	• نام بردن ۴ رنگ	• مفهوم بودن تمام صحبت هایش	• مفهوم بودن نیمی از صحبت هایش	۲
		• شناخت متضاد ۲ مورد	• شناخت خط بلندتر	• شناخت ۳ شیء	• نشان دادن حدائق ۴ تصویر	۳
		• کشیدن مربع از روی آن	• کشیدن بعلاوه (+) از روی آن	• کشیدن دایره از روی آن	• تقلید خط عمودی	۴
		• ایستادن ۶ ثانیه روی یک پا	• ایستادن ۴ ثانیه روی یک پا	• ایستادن ۲ ثانیه روی یک پا	• بالاپریدن	۵
						۶
						۷

### ارزیابی کودک از نظر وضعیت و اکسیناسیون:

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه
<ul style="list-style-type: none"> <li>کودک رامطابق دستورالعمل کشوری ایمن سازی ، واکسینه نماید.</li> <li>توصیه های پیشگیری از حوادث و سوانح در منزل را به مادر بگویید.</li> </ul>	واکسیناسیون ناقص (۱)	<ul style="list-style-type: none"> <li>درصورت پاسخ منفی درهروگره سنی</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>مادر را تشویق کنید که در مراقبتهای بعدی مراجعة کند</li> <li>توصیه های پیشگیری از حوادث و سوانح در منزل را به مادر بگویید.</li> </ul>	واکسیناسیون کامل (۲)	<ul style="list-style-type: none"> <li>مطابقت با جدول واکسیناسیون دارد</li> </ul>

طبقه بندی کنید	جوایهای مادر را با جدول واکسیناسیون برای گروههای سنی مقایسه کنید					
	فلج اطفال	۴ سالگی	۶ ماهگی	۶ ماهگی	تولد	۰ ب.ث.
• سه گانه	• سه گانه	• هپاتیت ب				
MMR		MMR	۱۲	۱۲	۱۲	۰
			ماهگی	ماهگی	ماهگی	۲ ماهگی
			۱۸	۱۸	۱۸	۴ ماهگی
			ماهگی	ماهگی	ماهگی	
			سه گانه	سه گانه	سه گانه	

### ارزیابی کودک از نظر وضعیت مکمل های دارویی :

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه
<ul style="list-style-type: none"> <li>به مادر توصیه کنید مکمل های دارویی را صرف نماید.</li> </ul>	صرف ناقص مکمل دارویی (۱)	<ul style="list-style-type: none"> <li>مطابقت با جدول مکمل های دارویی ندارد</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>مادر را تشویق کنید که در مراقبتهای بعدی مراجعة کند</li> <li>توصیه های پیشگیری از حوادث و سوانح در منزل را به مادر بگویید.</li> </ul>	صرف کامل مکمل دارویی (۲)	<ul style="list-style-type: none"> <li>مطابقت با جدول مکمل های دارویی دارد</li> </ul>

۱ روزگی تا یکسال	<ul style="list-style-type: none"> <li> قطره مولتی ویتامین یا A+D</li> </ul>
۶ ماهگی تا ۲ سال	<ul style="list-style-type: none"> <li> قطره آهن</li> </ul>

### ارزیابی کودک از نظر وضعیت آزمایش ها :

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه
<ul style="list-style-type: none"> <li>برای ارزیابی بیشتر یا درخواست آزمایش به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید.</li> </ul>	آزمایش غیرطبیعی	<ul style="list-style-type: none"> <li>آزمایش غیرطبیعی است</li> <li>عدم مطابقت با جدول آزمایش ها</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>به مادر اطمینان دهید که از نظر آزمایش موردنظر مشکلی ندارد.</li> </ul>	آزمایش طبیعی	<ul style="list-style-type: none"> <li>آزمایش ها مطابق با جدول و طبیعی است</li> </ul>

تا ۵ روزگی	<ul style="list-style-type: none"> <li>آزمایش تیروئید</li> </ul>
۶ تا ۹ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> <li>آزمایش کم خونی</li> </ul>
یک سالگی	<ul style="list-style-type: none"> <li>آزمایش ادرار</li> </ul>
سه سالگی*	<ul style="list-style-type: none"> <li>چربی خون*</li> </ul>

\* کودکان در معرف خطر

## مشاوره با مادر در مورد مشکلات تغذیه ای:

### ﴿اگر کودک زیر ۴ ماه سن دارد و شیر و یا غذای دیگری می خورد.﴾

- به مادر اطمینان بدهید که خود می تواند شیر مورد نیاز کودکش را تولید کند.
- توصیه کنید مرتب، روز و شب و با دفعات طولانی کودک را شیر بدهد و به تدریج غذاها و شیرهای دیگر را کم کند.
- اگر مادر مجبور است شیرهای دیگر را به کودک بدهد رخصوص موارد زیر با او مشاوره کنید:
  - تغذیه با شیر مادر را حتی شب ها ادامه دهد.
  - مطمئن شوید جانشین شونده مناسبی انتخاب کرده
  - مطمئن شوید طرز تهیه شیررا می داند و آن را بهداشتی تهیه می کند.
  - شیر آماده را بیشتر از یک ساعت نگه ندارد.
  - از گول زنک استفاده نکند.

### نحوه صحیح بغل کردن و پستان گرفتن شیرخوار:

- ﴿نشان بدهید که چگونه کودک را نکه دارد
- بدن و سرکودک در امتداد هم باشد
- صورت کودک مقابله پستان باشد
- بدن کودک نزدیک بدن او باشد
- تمام بدن کودک (نه فقط گردن و شانه او را) با دست حمایت کند
- ﴿به مادر نشان بدهید که چگونه کودک را به پستان بگذارد
- لب کودک با نوک پستان تماس داشته باشد
- صبر کند تا کودک دهانش را خوب باز کند
- نوک و قسمت بیشتری از هاله پستان در دهان شیرخوار باشد.

### ﴿اگر مادر برای تغذیه کودک از بطری استفاده می کند:

- به جای بطری فنجان را توصیه کنید.
- به مادر نشان بدهید که چگونه با فنجان به کودک شیر بدهد.

### ﴿اگر کودک خوب غذا نمی خورد با مادر مشاوره کنید:

- با کودک بنشینید و او را ترغیب نمایید.
- به کودک در ظرفها و کاسه های جدا خدا بدهید.
- از غذاهای نرم، متتنوع، اشتها آور و غذایی که کودک دوست دارد تا حد امکان به او بدهید.

### ﴿درمان برفک

- ﴿مادر باید:
- دستهایش را بشوید.
- پنبه تمیز را به یک چوب کبریت پیچیده (ویا یک گوش پاک کن را) با ۱ میلی لیتر محلول نیستاتین آغشته کندوروی لکه های سفید (برفک) داخل دهان شیرخوار بمالدواین عمل راه راه ۶ ساعت یکبار تکرار کند.
- دارو به نوک و هاله پستان مادر هم مالیده شود.

## آموزش و مشاوره با مادر - پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان

زیر ۴ ماه	۴ تا ۶ ماهگی	۷ تا ۱۱ ماهگی
<b>سوختگی</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اشیای سنگین یا ظرف های حاوی مایعات داغ روی میز نگذارید.</li> <li>• در پریزهای برق، محافظ پلاستیکی قرار دهید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• پیش از حمام کردن و شستشوی کودکان دمای آب را با پشت دست خود امتحان کنید</li> <li>• در پریزهای برق، محافظ پلاستیکی قرار دهید</li> </ul>
<b>سقوط</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• در هیچ سن و سالی کودک را در روروک نگذارید</li> <li>• محافظ در ابتدا و انتهای راه پله ها قرار دهید</li> <li>• کودک خود در جاهای بلند، بدون محافظ تنها رها نکنید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• هرگز کودکتان را وقتی محافظ گهواره یا تخت خواب بازیابی نمایند.</li> <li>• هرگز کودک خود را در جاهای بلند مانند میز، تخت خواب بدون حفاظ، نیمکت و صندلی، تنها رها نکنید.</li> <li>• ساک حمل شیرخوار را از زیر بگیرید</li> </ul>
<b>غرق شدگی و خفگی</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطل ها، تشت ها و حوضچه ها را خالی نگهدارید</li> <li>• استخرها از چهار طرف حفاظ دار کنید و در رود آنها را بخواهید</li> <li>• کیسه های پلاستیکی یا بادکشها را نزدیک کودک قرار ندهید</li> <li>• سیم تلفن، سیم های الکتریکی، نوارهای پرده و کرکره را از نزدیک تحت خواب کودکان یا محل بازی اودور کنید</li> <li>• اشیاء کوچک یا نوک تیزرا دور از دسترس کودک قرار دهید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• هرگز کودک خود را در تشت آب یا وان، تنها رها نکنید. همیشه با یک دست از آنها حفاظت کنید</li> <li>• اشیای کوچک یا نوک تیزرا دور از دسترس کودکان قرار دهید</li> <li>• کودک را به پشت با به پهلو بخواهید (به شکم نخوابانید)</li> <li>• شیرخوار را قنداق نکنید، شکم کودک را محکم نبندید، از بالش استفاده نکنید</li> <li>• محیط زندگی کودکان را عاری از دود (سماور-والر- منقل و ...) نگه دارید.</li> <li>• کمک های اولیه و احیای قلبی عروقی شیرخوار را باموزید</li> </ul>
<b>مسمو میت</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اشیاء خطرناک و آلوده، روی سطح زمین و در معرض دید کودک قرار ندهید</li> <li>• مواد شیمیایی (شوینده، پاک کننده، سموم) و داروها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• درب کابینت و کمد توسط کودک قابل باز کردن نباشد.</li> <li>• مواد شیمیایی (شوینده، پاک کننده، سموم) و داروها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.</li> <li>• مواد سمی (نفت یا مواد شوینده) را در ظروف مخصوص ریخته و دور از دسترس کودکان قرار دهید</li> </ul>
<b>حوادث ترافیکی</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید</li> <li>• صندلی عقب اتوموبیل این ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید</li> <li>• صندلی عقب اتوموبیل این ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است</li> </ul>

## مصاحبه و مشاوره با مادر - پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان

عنوان ↓	سن ←	۱ سالگی	۲ سالگی	۳ سالگی	تا ۸ سالگی
<b>سوختگی</b>	• ظروف خوراک پزی و مایعات داغ را دور از دسترس کودکان قرار دهید	• ظروف خوراک پزی و مایعات داغ را دور از دسترس کودکان قرار دهید	• ظروف خوراک پزی و مایعات داغ را دور از دسترس کودکان قرار دهید	• ظروف خوراک پزی و مایعات داغ را دور از دسترس کودکان قرار دهید	• قوانین اینمی توچرخه سواری (کلاه اینمی و...) را آموزش دهید • مطمئن شوید محل بازی کودک این است
<b>سقوط</b>	• در هیچ سن و سالی کودک را در رو روک نگذارید • روی پنجره ها و پله ها حفاظ قرار دهید	• روی پنجره ها و پله ها حفاظ قرار دهید	• بالا و پایین رفتن از پله را به کودک بیاموزید	• بالا و پایین رفتن از پله را به کودک بیاموزید	• شناو قوانین اینمی آب را به کودک آموزش دهید
<b>غرق شدگی و خفگی</b>	• کیسه های پلاستیکی یا بادکنکها را در اختیار کودک قرار ندهید. • اطراف استخرها و حوضچه ها حفاظ قرار دهید	• اطراف استخرها و حوضچه ها حفاظ قرار دهید	• اطراف استخرها و حوض ها حفاظ قرار دهید	• اطراف استخرها و حوض ها حفاظ قرار دهید	• مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید
<b>مسومومیت</b>	• درب کابینت و کمد توسط کودک قابل باز کردن نباشد. • مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید	• مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید	• مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید	• مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید	• از مرابت از کودک در یک محیط این در پیش و پس از مدرسه اطمینان یابید • چگونگی ارتباط با غریبیه ها را آموزش دهید • شماره تلفن فوریتها را به کودک آموزش دهید
<b>صدمات بدنی</b>	• کودکان را با حیوانات خانگی تنها نگذارید • از نگهداری حیوانات در محل زندگی خودداری کنید	• کودکان را تهاره هانکنند باشید • به کودک بیاموزید با افراد غریبیه صحبت نکند	• از محل کودک خود در همه زمان مطلع باشید	• از محل کودک خود در همه زمان مطلع باشید	• بر اینمی محیط های بازی تاکید کنید. • صندلی عقب اتوموبیل اینم ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است • قوانین اینمی رفت و آمد به مدرسه و مهارت های اینمی پیاده رو را به کودک بیاموزید
<b>حوادث ترافیکی</b>	• از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید • صندلی عقب اتوموبیل اینم ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است	• از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید • صندلی عقب اتوموبیل اینم ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است	• از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید • صندلی عقب اتوموبیل اینم ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است	• از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید • صندلی عقب اتوموبیل اینم ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است	

## مصاحبه و مشاوره با مادر-رابطه مقابله کودک و والدین

تاریخ	محتوای مصاحبه	ردیف
۱۸-۱۵ ماهگی	ایجاد و سایل ارتباط و مشارکت	۱
۱۲-۹/۵ ماهگی	تحسین به اظهار محبت	۲
۹-۷ ماهگی	تحسین در فعالیت ها	۳
۶-۴/۵ ماهگی	پاسخ های اغراق آمیز	۴
۴-۳ ماهگی	برقراری ارتباط عاطفی	۵
۱۸-۱۵ ماهگی	تحمیل و چرخشی	۶
۱۲-۹/۵ ماهگی	تحمیل راهکردن اشیاء	۷
۹-۷ ماهگی	تحمیل حس استقلال	۸
۶-۴/۵ ماهگی	تحمیل کنگکاوی	۹
۴-۳ ماهگی	تحمیل حس	۱۰
۱۸-۱۵ ماهگی	تمرين راهکردن اشیاء	۱۱
۹-۷ ماهگی	تمرين راهکردن وزن بدن	۱۲
۶-۴/۵ ماهگی	تمرين عضلات پشت و گردن	۱۳
۴-۳ ماهگی	تمرين عضلات باسن و زانو	۱۴

- بازیهای گروهی یکدیگر و سایل بازی را بین همه تقسیم کنید.
- هر گروه مشارکت و کارهای سخاوتمندانه (دادن مقادیر ارزیستی اش) او را تحسین کنید.
- تصمیم های اورایه سادگی و بدون نگرانی پذیریده هر قدر در خواست کنید که کنند.
- معنی کند با منحرف کردن حواس اورایه طرق مختلف از منظر کاری اوجلوگری کنند.

- محبت و توجه اورانسیت به دیگران امثل خواه و برادران مکان به جمع بنشانید.
- اجازه دهد بعضی از ایساهاش (جواب، کلاه) را خودش پوشید.
- اورا بیوسید و برایش دست تکان دهد.
- آموژش شترک کردن را آغاز کنید.
- فرگزاری زور استفاده تکنیکی را باشید.

- هنگامی که چیزی را که داده اند نشان می دهید خواص آن را (اسقفل نرمی، رنگ، صدا) شرح دهد.
- دستهای طولانی تروپیچیده تبریا شنید.
- از اشیا، سه بعدی که برای قراردادن شکلهای مختلف در شکافهای مخصوص طراحی شده باشند.
- می شود تهیه کنید و کم در محل درست خود قرار دهد.

- یادگیری اورا از این طریق تکرار تشویق کنید.
- وقتی کاری انجام می دهد برش دهد.
- عبارت کلیدی را برایها برای او تکرار کنید.
- بخوانید.

- با استانهای کوتاه برای او بخوانید.
- کارهای خود را همراه با نشان داده.
- کتابهای کوکانه با تاصاویر خوش رنگ و بزرگ انتخاب و یک قصه ساده و کوتاه در مورد آن بگویید.
- زیادی با آب بازی کنیده او را بخوبی.
- بدهید آنها را بر خانی کنند.

- اجازه دهد کوکانه لباسها را تا آنچه که ممکن است خودش بپوشد و در آورد.
- با استفاده از اسپایس بازی که بچاشت (اسخانتم سازی) باهم چفت می شود برای تمرين او غرام اورید.

- اورا تشویق کنید یک توب را به طرف شما بغلطاند.
- مقدار زیادی چیزهای کوچک (قطی، کاسه) برای وفرام کنید تا داخل وخارج کردن اشیاء اتمرين کنند.
- کتاب باور از خود خوش بخوبی.
- اوشنان دیدیچکونه آنها را بر بزند.
- گاهی غذاهای نینه مایع که به قاشق می چسبید را بگاریدتا به تنها بخورد.

- در حالات چهارست و پیش از تشویق کنید که مسافت های کوتاه را می کند.
- صنایل محکمی برای نشستن پیش از آن را بازی برای بزند.
- با توب بازی آرام اورا به لگزدن او فراهم اورید.
- تمرين قدم زدن پیدوار زدن.

- سپرایست اند را به او تمرين بدید.
- آنکشتن دادن اشیاء مرد علاقه بتواند خود را به کوتاه بگرداند.
- در حالات کوتاه را ایجاد کنید.
- با قلاب کردن دستهای او به اثاثه ثابت منزل اورا به ایستاندن تشویق کنید.

- های استثنی صورت و راه راه شما تجاه دهد.
- انتظار نداشته باشیده راحتی دور کنجهای بود و یاتو قف کنند.

- کوک را به آرمی و مکرر تکان خود را به طرف ایجاد کنید.
- نمایش و نشان دادن اشیاء مرد علاقه اش اورا تشویق به حرکت کنید.
- با قلاب کردن دستهای او به اثاثه ثابت منزل اورا به ایستاندن تشویق کنید.

- روزی ۲ تا ۳ بار اورا طوری نگه دارد که صورتش رو به پایین باشد (درو رضیتی دم).
- در حالی که پشت خوابیده است، شی رنگی را در میان دیدش حرکت دهد.
- حرکت کردن سر خود تشویق شود.

- دراختن چیزی در درستان کوک آنرا تکان دهد.
- اشیاء مقنواتی را به اونشان دهد.
- رازیک دست به دست دیگر شدید.

- دشته باشید.
- به راحتی بفهد که به حرکت و رفتار اشناز دهد.
- مهما هر آرایه اومعرفی کنید تا به افراد غریبی عادت کند.

- صدای اورا تلید کنید.
- مهما هر آرایه کوک دارد آرید و صبر کنید.
- تایپس دهد.

## مشاوره با مادر در مورد بهداشت دهان و دندان

### اقدامات لازم جهت بیرون افتادن کامل دندان از دهان

- اگر دندان دائمی کامل از دهان بیرون بیفتد، بهورز یا والدین می‌توانند تاج دندان را نگه داشته و ریشه را زیر فشار ملایم آب یا آب جوشیده سرد شده بگیرند. در این حالت به هیچ وجه دندان نباید با پارچه یا دست پاک شود.
- سپس باید دندان در یک محیط مرطوب مثل سرم شستشوی نمکی، شیر، آب جوشیده سرد شده، و یا زیر زبان فرد قرار گیرد و بلا فاصله (در حداقل زمان ممکن) به دندانپزشک ارجاع شود.
- در صورتیکه صدمه در محیطی آلوده اتفاق افتاده و دوره واکسیناسیون کامل نباشد، باید یک نوبت واکسن کراز به بیمار تزریق شود، سپس ارجاع شود.

### توصیه های بهداشت دهان و دندان جهت آموزش والدین

- در صورت استفاده از قطره آهن، برای جلوگیری از تغییر رنگ دندانها، قطره آهن را در عقب دهان کودک بچکانید و پس از دادن قطره، به نوزادان شیر خوار شیر و به کودکان بزرگتر آب بدھید.
- حداقل زمان برای مسوак زدن ۴ دقیقه می‌باشد.
- زمانهای مناسب برای مسواك زدن (۲بار در روز): صبح‌ها (بعد از صبحانه)، شبها (قبل از خواب)
- سطوح بین دندانی به هیچ وجه با استفاده از مسواك تمیز نمی‌شوند و تنها با استفاده از نخ دندان می‌توان این سطوح را تمیز کرد. می‌توان پس از سن ۶ سالگی از نخ دندان استفاده کرد.
- علاوه بر مسواك و نخ دندان، استفاده از فلوراید (به صورت دهان‌شویه، ژل، قرص و...) و فیشور سیلات از مهمترین راههای پیشگیری از پوسیدگی می‌باشد، که بایستی با مشاوره دندانپزشک استفاده شود.
- چون دندانهای شیری راهنمای مناسب جهت رویش جوانه دندانهای دائمی می‌باشد و فضای لازم برای دندانهای دائمی را حفظ می‌کنند، از کشیدن زود هنگام آنها خودداری کنید.

### روشهای صحیح مسواك زدن

زیر ۱ سال	۱-۲ سال
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ برای مسواك کردن کودک ۱-۲ ساله روش افقی بهترین روش است.</li> <li>▪ در این روش، مسواك بطور افقی بر روی سطح داخلی و خارجی و جونده دندانها گذارد شده و با حرکت مالشی به جلو و عقب حرکت داده می‌شود.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ یک تکه گاز تمیز را دور انگشت سبابه پیچیده و لثه بالا و پایین را به آهستگی تمیز نمایید یا در صورت دسترسی به مسواك انگشتی، آنرا روی انگشت اشاره قرار دهید و به آرامی و با حرکات ملایم، دهان کودک را تمیز کنید.</li> <li>▪ اینکار را دوبار در روز بعد از اولین و آخرین وعده غذایی انجام دهید که روی هم رفته ۲ دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مسواك با زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان در محل اتصال لثه و دندان قرار داده شود.</li> <li>▪ ابتدا با حرکت لرزشی و سپس با حرکت مچ دست موهای مسواك روی سطح دندان به طرف سطح جونده چرخانده شود.</li> <li>▪ این حرکت حدود ۱۵ تا ۲۰ بار برای هر دندان باید انجام شود.</li> <li>▪ برای سطح داخلی دندانهای جلو، مسواك را باید به صورت عمودی بر روی سطح داخلی دندانهای جلو قرار داد و با حرکت بالا و پایین این سطوح را تمیز کرد.</li> <li>▪ برای مسواك کردن سطوح جونده، موهای مسواك را باید بر روی سطح جونده قرار داد و با فشار بر روی این سطح و با حرکت جلو و عقب مسواك سطح جونده را به خوبی تمیز کرد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ والد پشت سر کودک طوری قرار می‌گیرد که هر دو به یک جهت نگاه کنند.</li> <li>▪ کودک سر خود را به بازوی چپ والد تکیه دهد.</li> <li>▪ مسواك به روش افقی روی همه سطوح دندانی به حرکت درآید.</li> <li>▪ نباید والد جلوی کودک قرار گیرد، چون سر او بدون حمایت می‌ماند.</li> </ul>

### مشکلات تغذیه ای

بعد از ۵ روز (کودک بالای ۲ماه) و ۱ روز(کودک زیر ۲ماه) :

کودک را از نظر وضعیت تغذیه ای ارزیابی کنید:

» در مورد هر مشکل تغذیه ای که در اولین مراقبت پی برده اید، سئوال کنید

» در مورد هر مشکل تغذیه که جدیداً یا قبلاً بروز کرده، مشاوره کنید.

» اگر در مشاوره با مادر، تغییر تغذیه ای قابل ملاحظه ای را مشاهده کرده اید، ازو بخواهید که به مراره کودکش مجدداً مراجعه نماید

### اختلال رشد / رشد نامعلوم

بعداز ۰ روز کودک زیر ۲ماه / بعداز ۵ روز کودک زیر یکسال / بعداز ۳۰ روز کودک بالای یکسال

کودک را از نظر وضعیت وزن ارزیابی کنید:

» اگر کودک اختلال رشد ندارد (شیرخوار زیر ۲ماه بیش از ۲۰۰ گرم در ۱۰ روز وزن اضافه کرده باشد)، مادر را به ادامه توصیه ها تشویق کنید

» اگر کودک هنوز اختلال رشد دارد (شیرخوار زیر ۲ماه کمتر از ۲۰۰ گرم در ۱۰ روز وزن اضافه کرده باشد)، وضعیت تغذیه ای او را بررسی کنید اگر مشکل تغذیه ای وجود ندارد، مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید

### رشقدی نامطلوب / رشد قدری نامعلوم

بعداز ۳ماه کودک زیر ۲سال / بعداز ۶ماه کودک بالای دوسال

کودک را از نظر وضعیت قد ارزیابی کنید:

» اگر کودک رشد قدری طبیعی دارد، مادر را به ادامه توصیه ها تشویق کنید

» اگر کودک رشد قدری طبیعی ندارد او را برای بررسی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید

### دورسر نامطلوب / دورسر نامعلوم

بعداز ۲ هفته کودک زیر ۶ماه / بعداز ۱ماه کودک بالای ۶ماه

کودک را از نظر وضعیت دورسر ارزیابی کنید:

» اگر کودک دورسر طبیعی دارد، مادر را به ادامه توصیه ها تشویق کنید

» اگر کودک دورسر طبیعی ندارد او را برای بررسی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید

## پیگیری

### مشکلات تکاملی

بعد از ۲ هفته :

کودک را لازم نظر و وضعیت تکاملی ارزیابی کنید:

- ﴿ اگر هنوز مشکل تکاملی (کلیدی یا غیرکلیدی) وجود دارد برای ارزیابی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید
- ﴿ اگر مشکل تکاملی (کلیدی یا غیرکلیدی) وجود دارد را تشویق کنید که برای مراقبتها بعدی مراجعته نماید

### زردی خفیف:

بعداز ۱ روز :

شیرخوار را لذت نشانه های خطرناک داری ارزیابی کنید

- ﴿ اگر هر یک از نشانه های خطرناک داری باشد یا زردی به پایین تراز شکم گسترش پیدا کرده است فوراً اورا به نزدیکترین مرکز درمانی ارجاع دهید.
- ﴿ اگر گسترش زردی فرقی نکرده است، بعداز یک روز دیگر مجدد ارزیابی کنید اگر برای بار دوم فرقی نکرده به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید.
- ﴿ اگر گسترش زردی کمتر شده است به مادر توصیه کنید اگر زردی بیش از ۱۴ روز ادامه پیدا کرد نزد شما مراجعته کند تا برای بررسی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع داده شود

### برفک :

بعداز ۱۰ روز

دهان کودک را برای برفک نگاه کنید و همچنین ازنظر وضعیت تغذیه ای او را ارزیابی کنید:

- ﴿ اگر برفک بدتر شده یا اگر کودک در پستان گرفتن یا مکیدن سینه مشکل دارد:
- ﴿ پنبه تمیزابه سریک چوب کبریت پیچیده (ویاک گوش پاک کن را) با اسی سی محلول ویوله دوزانسین آغشته کندوروی لکه های سفید (برفک) داخل دهان شیرخوار بمالدواین عمل راهنمایی را انجام دهد.
- ﴿ داروی نوک و هاله پستان مادر هم مالیده شود
- ﴿ اگر برفک بهتر شده یا فرقی نکرده و شیرخوار مشکل تغذیه ندارد برای مدت ۵ روز دیگر درمان را ادامه بدهید.
- ﴿ اگر برفک بهبود نیافتد، دیگر درمانی لازم نیست.
- ﴿ اگر برفک بهتر شده یا فرقی نکرده و مشکل تغذیه ندارد برای مدت ۵ روز درمان را ادامه بدهید.


### مشکلات دهان و دندان

بعد از ۵ هفته :


کودک را لازم نظر و وضعیت دهان و دندان ارزیابی کنید:

- ﴿ اگر کودک و والدین طریقه مسوک زدن صحیح را آموخته اند، والدین را به ادامه توصیه ها تشویق کنید.
- ﴿ اگر کودک و والدین طریقه مسوک زدن صحیح را به خوبی یاد نکرftه اند، جهت آموزش کاملتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع شود.


## وزن برای سن - پسر 0-3 سال




## وزن برای سن - دختر ۰-۳ سال




## وزن برای سن - پسر 3-8 سال




## وزن برای سن - دختر 3-8 سال




قد برای سن - پسر ۰-۲۳ماه




## قد برای سن - دختر 0-23 ماه




## قد برای سن - پسر 2-8 سال



## قد برای سن - دختر 2-8 سال



دور سر برای سن - پسر 0-18 ماه



## دور سر برای سن- دختر 0-18 ماه

